

vyšetření můžete cítit tlaky v břiše, což je způsobeno tlakem vlastního endoskopu a rovněž tlakem plynu, kterým se střevo nafukuje. Endoskop navíc umožňuje použití drobných klíčtek, kterými se dá bezbolestně odštlápnout drobný vzorek sliznice (biopsie), který se zasílá k histologickému vyšetření. Vyšetření trvá průměrně 20–30 minut. Záleží na kvalitě střevní přípravy, předchozích operacích, přítomnosti polypů a na dalších faktorech.

PO VYŠETŘENÍ

- po výkonu budete moci odpočívat na lůžku našeho pracoviště 30–60 minut
- při nekomplikovaném vyšetření je možno při odeznění účinku tlumivých léků/lehké narkózy opustit nemocnici s doprovodem
- před propuštěním domů budete vybaveni zprávou pro doporučujícího lékaře

Objednávky na tel. čísle: 325 505 274

Kde nás najdete?

Areál Nemocnice Nymburk, Boleslavská 425/9, vchod B - přízemí.

KOLONOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ

O jaké vyšetření se jedná?

Kolonoskopie je endoskopické vyšetření dolní části trávicí trubice. Jedná se o zavedení ohebného endoskopu, kterým lze vyšetřit konečník a tlusté střevo, případně provést léčebný zákrok. Vyšetření se provádí podle typu výkonu ambulantně nebo za hospitalizace.



nemocnice
nymburk



nemocnice
nymburk

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

Kvalitní kolonoskopické vyšetření je závislé na co nejlepší očištění tračníku (tlustého střeva). Toho lze dosáhnout dietou a vypitím projímavých očištných roztoků a dostatečným příjmem tekutin.

1) Léky

- pokud užíváte léky zvyšující riziko krvácivých komplikací (Warfarin, Heparin, Anopyrin a jiné) a doporučující lékař určí provedení vyšetření, doneste s sebou výsledky krevního obrazu, Quickova testu a APTT. Je nutné se s doporučujícím lékařem poradit o jejich přechodném vysazení
- pokud užíváte léky obsahující železo, vysadte je alespoň 7 dní před vyšetřením
- kyselina acetylsalicylová (Anopyrin, Acylpirin,...), Clopidogrel (Plavix, Zyllt,...), Ticlopidin (Ticlid, Tagren,...) – vysadit 7 dní před vyšetřením
- Pradaxa, Xarelto, Eliquis – vysadit 2 dny před vyšetřením
- ostatní léky není třeba vysazovat, ale užíjte je až po vyšetření

2) Dieta

týden před vyšetřením

- vynechte potraviny s nestravitelnými zbytky: jahody, kiwi, hroznové víno, zeleninu, obiloviny, luštěniny, celozrnné pečivo, semínka, obilné kaše, mák, ořechy, tuhé maso, rýži atd.

den před vyšetřením

- celý den nic nejzte, pijte jen čiré tekutiny (voda, limonáda, ovocná šťáva bez výrazného zabarvení, čisté vývary), vyvarujte se mléku a alkoholu

3) Projímadla den před vyšetřením a v den vyšetření

Příprava polyethylenglykolem (Fortrans)

- Přípravek obsahuje 4 sáčky (1 sáček Fortrans do 1 l vody), nutno vypít všechny sáčky – pijte přibližně rychlostí 1 litr za 2 hodiny v den před vyšetřením od rána do večerních hodin
- přípravek chutná lépe chlazený a ochucený např. sirupem
- doporučený režim dodržte i pokud z konečníku odchází čirá tekutina
- během přípravy hojně pijte čiré tekutiny

Příprava Moviprep, Picoprep – dodržujte návod dle příbalového letáku

DEN VYŠETŘENÍ

- **4 hodiny** před výkonem již nic nepijte, nekuřte
- k vyšetření si doneste žádanku doporučujícího lékaře a seznam Vámi užívaných léků
- **přijďte s doprovodem, nebo si zajistěte odvoz** (po podání tlumivých léků/lehké narkózy během vyšetření nemůžete řídit motorová vozidla, ani jiné dopravní prostředky)

JAK BUDE VYŠETŘENÍ PROBÍHAT?

Kolonoskopie se provádí na gastroenterologické ambulanci v předem domluveném termínu. Vyšetření se provádí po důkladné přípravě a edukaci pacienta včetně podepsání informovaného souhlasu s výkonem a podání tlumivých léků. Budete mít možnost klást lékaři nebo sestře doplňující otázky, na které Vám rádi odpoví. Vyšetření se provádí v poloze na boku, kdy se do konečníku zavede ohebný přístroj (endoskop), kterým se střevo vyšetřuje pomocí optiky. Při